



Что должно беспокоить родителей в ребенке в возрасте от 3 до 6 лет...

3-5 лет

- Чрезмерно беспокойное поведение, неусидчивость, импульсивность;
- Раздражительность, плаксивость, резкие смены настроения;
- Чрезмерная медлительность, вялость, апатичность;
- Плохой сон (медленно засыпает, вскрикивает во сне, часто просыпается и т.п.);
- Страхи (боязнь темноты, одиночества, ночные страхи);
- Хронические заболевания;
- Тики (непроизвольное подергивание век, мышц лица, шеи, навязчивые движения, обкусывание ногтей);
- Трудности контактов со сверстниками и взрослыми;
- Сниженная острота зрения (близорукость, дальнозоркость), косоглазие и другие нарушения зрения;
- Задержка в речевом развитии (появление связной речи к 3 годам и позже), дефекты звукопроизношения;
- Заикание.

5-6 лет

- Частые хронические заболевания, операции, травмы;
- Импульсивность, бесконтрольность поведения (преобладание «хочу» над «можно»);
- Чрезмерная (бесцельная) двигательная активность, непоседливость, крикливость, раздражительность;
- Настойчивая болтовня;
- Нарушения сна;
- Страхи;
- Навязчивые движения, кривлянья;
- Боязнь новых вещей, чужих людей, возникающих впервые ситуаций;
- Трудность общения с незнакомыми сверстниками, взрослыми.

Подготовил:

педагог-психолог Попова Ю.В.